Frontier® Optima

Begin die seisoen met gemoedsrus.
'n Multigewasoplossing vir vooropkoms-onkruidbeheer.

NOU!
GAAN ONS BOER™

BASF
We create chemistry

BASF Suid Afrika (Edms) Bpk • Sestiendestraat 852, Midrand, 1685 • Posbus 2801, Halfweghuis, 1685 • Tel: +27 11 203 2400 • Faks: +27 11 203 2461
Webblad: www.agro.basf.co.za • Mobielewebblad: m.agro.basf.co.za
Frontier® Optima Reg. Nr. L7011 Wet Nr. 36 van 1947. Aktiewe bestanddeel: Dimethenamid-p 720 g/ℓ. Versigtig • **Frontier® Optima** is 'n geregistreerde handelsmerk van BASF.

Frontier® Optima

Met Frontier® Optima is dit altyd mooiweer … sodat jy jou seisoen kan optimaliseer.

Gemoedsrus met die toediening van 'n multigewasoplossing

- **Frontier® Optima** het minder reën nodig as ander onkruiddoders in sy klas en het meer konstante resultate in droër gronde
  - Foto-stabiel en kan op die grondoppervlak lê sonder om te verdamp of af te breek tot dat genoegsame water beskikbaar is
- **Uitstekende vooropkoms-beheer** van eenjarige grasse, breëblaaronkruide en in sekere toestande geeluintjies
- **Vinnige werking en uitstekende wateroplosbaarheid**
  - Nadat die grondoppervlak ingedring word, vul **Frontier® Optima** vinnig die grondvogspasies in die grondprofiel wat dit **geredelik beskikbaar maak vir opname deur ontkiemende onkruide**
- 'n **Multigewasoplossing** – kan toegedien word op mielies, sojabone, droëbone, nierbone, grondboontjies, graansorghum en tabak
- Bied verbeterde **gewasveiligheid**
- **Uitstekende selektiwiteit**

Aanbeveling

Dosis:
Sojabone:
0.5 – 1.25 mℓ/ha **Frontier® Optima** – afhangend van die klei-inhoud van die grond.
Ander gewasse:
Mielies:
0.5 – 1.25 ℓ/ha **Frontier® Optima** – afhangend van die klei-inhoud van die grond.

- Sien asseblief etiket vir volledige inligting.

Onkruide wat beheer word

Die volgende plantspesies word gewoonlik deur 'n vooropkoms-toediening van **Frontier® Optima** teen die voorgeskrewe dosis beheer.

11 eenjarige grasse	
Brachiaria eruciformis Litjiesinjaalgras	*Panicum schinzii* Soet Buffelsgras
Digitaria sanguinalis Kruisvingergras	*Setaria faberi* Sjineseborselgras
Digitaria ciliaris Tropiese vingergras	*Setaria pallide-fusca* Rooi borselgras
Echinochloa crus-galli Hanepootmanna	*Setaria verticillata* Klitsborselgras
Eleusine corocana Jongosgras	*Urochloa panicoides* Beesgras
Panicum maximum Gewone Buffelsgras	

16 breëblaaronkruide	
Amaranthus deflexus Meerjarige misbredie	[1]*Datura ferox* Groot stinkblaar
Amaranthus hybridus Gewone misbredie	[1]*Datura stramonium* Stinkblaar
Amaranthus spinosus Doringmisbredie	*Galinsoga parviflora* Knopkruid
[1]*Bidens pilosa* Knapsekêrel	*Nicandra physaloides* Basterappelliefie
[1]*Chenopodium album* Wit hondebossie	*Portulaca oleracea* Porslein
Cleome monophylla Rusperbossie	*Richardia brasiliensis* Tropiese Richardia
[1]*Commelina benghalensis* Bengaalse wandelende Jood	[1]*Tagetes minuta* Kakiebos
[1]*Crotalaria sphaerocarpa* Wilde lusern	[1]*Tribulus terrestris* Dubbeltjie

[1]Die beheer van hierdie onkruide wissel.
Laat en diep-ontkiemende onkruide sal nie doeltreffend beheer word nie.

UINTJIES
Cyperus esculenthus - Geeluintjie

Die beheer van geeluintjies kan verbeter word, deur aan die volgende voorwaardes te voldoen:

- Die plantproses moet onmiddellik voorafgegaan word deur 'n deeglike bewerking met 'n skaarploeg.
- 'n Relatiewe fyn, egalige en ferm saadbed voorberei is.
- Die onkruiddodertoediening deur minstens 10 - 15 mm sagte deurdringende reën (of besproeiing), gevolg word, om die onkruiddoder in die grond in te was, voordat die geeluintjies opkom (gewoonlik 7 - 10 dae na deeglike grondbewerking). Meer reën is nodig op swaarder grond, vir goeie resultate. Onvoldoende vog is dikwels die rede waarom swak beheer op turfgronde verkry word.
- Wanneer in klam grond geplant word, moet **Frontier® Optima** tydens, of onmiddellik na die plantproses toegedien word, om onkruiddoder aktivering, voor die opkoms van die geeluintjies te verseker.
- Wanneer in droë grond geplant word (onvoldoende vog om geeluintjies te laat ontkiem), moet die toediening van **Frontier® Optima** uitgestel word, tot **so na as moontlik aan, maar beslis voor, die eerste reën.**

Vir meer inligting besoek die BASF Landbouoplossingswebblad www.agro.basf.co.za

BASF Suid Afrika (Edms) Bpk • Sestiendestraat 852, Midrand, 1685 • Posbus 2801, Halfweghuis, 1685 • Tel: +27 11 203 2400 • Faks: +27 11 203 2461
Webblad: www.agro.basf.co.za • Mobielewebblad: m.agro.basf.co.za
Frontier® Optima Reg. Nr. L7011 Wet Nr. 36 van 1947. Aktiewe bestanddeel: Dimethenamid-p 720 g/ℓ. Versigtig • **Frontier® Optima** is 'n geregistreerde handelsmerk van BASF.

uppe marketing A20578