

Opera®

Opera® - AgCelence® vir almal.

BASF se optimale swamdoder wat die **AgCelence®**-effek in mielies en sojabone verskaf.

AgCelence®

Opera® verskaf **AgCelence®**-voordele van:

- Verhoogde toleransie teen stremming
- Verhoogde plantgroeidoeltreffendheid
- Uitstekende siektebeheer

Betroubaarheid

- Die kragtige sinergistiese werking van **F500®** en epoxiconazole verskaf voorkomende beheer van:
 - roes, noordelike blaarskroei en grysblaarvlek in mielies
 - roes in sojabone

Buigsaamheid

- **Opera®** is geregistreer vir beide grond- en lugtoediening met 'n spesifieke aanbeveling vir streke met 'n laer digtheid van plant populasies

Opbrengs op belegging

- Die optimum lading van **F500®** en epoxiconazole bied 'n uitstekende opbrengs op belegging vir streke met laer siektedruk
- **Opera®** bevat BASF se beproefde en betroubare **F500®** aktiewe bestanddeel om die **AgCelence®**-effek met bogemiddelde opbrengsvoordeel vir boere, te verskaf



Beste opbrengs op belegging

Verhoogde plantgroeidoeltreffendheid

- Doeltreffende fotosintese
- Beter gebruik van stikstof
- 'n Toename in biomassa

Uitstekende siektebeheer

- Blaarsiektes
- Verhoogde weerstand teen lae vlak of "sub-kliniese" siektes

Verhoogde toleransie teen stremming

- Inhibeer etileenproduksie
- Verbeter droogte-verdraagsaamheid

NOU!
GAAN ONS BOER™




BASF
We create chemistry

AgCelence®
Verwag meer.

Opera® resultate.


Mielies

Donkerhoek, Gauteng




Soja opbrenge

Balfour 2019/20




Delmas 2019/20



Soja lande

Delmas 18 Maart 2020



Dosisse:

Mielies

750 ml/ha.

Die eerste toediening van Opera® moet by groeistadium 31 (eerste node bo die grondoppervlak sigbaar – ook die 5- tot 6-blaarstadium genoem) geskied. 'n Tweede toediening van Opera® word by groeistadium 51 (pluim is sigbaar) aanbeveel.

Grondtoediening: Dien toe as 'n volbedekking in 300 – 500 l water/ha.

Handspuit met rotasieskyf: Soos hierbo aanbeveel in ten minste 50 – 70 l water/ha.

Lugtoediening: Soos hierbo aanbeveel in 40 l water/ha.


Sojabone

500 ml/ha.

Dien twee bespuitings toe. Die eerste bespuiting word as voorkomende behandeling teen die siekte toegedien. Die eerste toediening moet op die vroeë blomstadium of wanneer siektesimptome die eerste keer waargeneem word, geskied. 'n Tweede bespuiting word ongeveer 3 – 4 weke na die eerste bespuiting tydens peulontwikkeling en pitvul toegedien.

Grondtoediening: Dien as 'n volbedekking in 400 l water/ha toe.

Sien asseblief etiket vir volledige inligting.



Vir meer inligting besoek die
BASF Landbouoplossingswebblad
www.agro.basf.co.za